





Wytczne dotyczce obsugi

Rurka przedzujccej do infuzji ASTOTUBE moe byc stosowana wycznie w polczeniu z ogrzewaczami ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS i PRISMATHERM II oraz standardowymi zastawkami do infuzji transfuzji i standardowymi kaniulami na state kaniulami dozylnymi. ASTOTUBE moze byc stosowany wyycznie w faszowych placzkach ochrony zdrowia i wyycznie przez wykwalifikowan personel.

Czas trwania stosowania nie moze przekracza 96 godzin.

- Nalezy wcisnac koniec dozylny rurki przedzujccej do infuzji (zenski lacznik luwr) na tyt statystwu na probowki (Ryc. 1).
- Zaczynajac od tytu, zwinac i wprowadzic rurke przedzujccej do rurki wskazywajce zegara ku gorze i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara ku gorze i wokol okregznego rowka wymiennika ciepla (Ryc. 2).
- Po pozostawieniu ostygnietu petli wcisnac rurke przedzujccej do infuzji na przk statystwu na probowki (Ryc. 3).
- Polaczyc rurke przedzujccej do infuzji z zestawem infuzyjnym i pojemnikiem z plynem (Ryc. 4).
- Napelnic zestaw infuzyjny: pozwol na plyniecie plynu do czasu, gdy w ukladzie nie bedzie widocznego powietrza i wszystkie linie beda cakowicie wypelnione plynem (Ryc. 5).
- Polaczyc strong pacjenta rurki przedzujccej do infuzji z kaniula pacjenta i upewnic sie, ze polczenie jest dobrze zamocowane.

Informacje dotyczce bezpieczenstwa i ostrzezenie

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

- Nie stosowac, jeeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie uzywac wyrobu, jeeli nasadki ochronne zostaly zdjete.
- Niektore leki mogq byc niezgodne z materialami i komponentami drenow lub z innymi lekami podawanymi rowniegle. W odniesieniu do lekow nalezy zapoznac sie z ich charakterystykami produktu leczniczego.
- Ropowne uszkie tworzya ryzyko zakazenia pacjenta lub uzynkowienia. Zanieczyszczenie wyrobu moze doprowadzic do obrzdu ciata, choroby lub zgony pacjenta. Przygotowanie wyrobu do ponownego uzytku moze niekarcznie wplynac na jego integralnosci strukturalna.
- Uzyty wyrob nalezy uzytyzowac zgodnie z obowiazujcymi przepisami lub procedura stosowanq w placówce ochrony zdrowia.

Ryzyko zatoru powietrzego!

- Niektore materialy powlokiq sie gazq (tworzenia pchylkow) w trakcie ogrzewania plynow.
- Nalezy upewnic sie, ze wszystkie polczenia całego systemu, w ktorym plynie plyn, sq szczelne, aby zapobiec wysokiemu plynu i przegrzaniu przedostaniu sie powietrza do systemu.
- Niektore naprawy uszczelniajcy linie jezytowane zostaly przez naprzeciwie leczenia.
- Nalezy zachowac szczegolnq ostroznosci i dopilnowac, aby blos powietrza nie dostal sie do organizmu pacjenta.

Ryzyko hemolizy!

- Nalezy upewnic sie, ze linia infuzyjna nie jest zagieta.
- Opody stanowiące zagrozenie biologiczne uzytyzowac zgodnie z lokalnie obowiazujacq procedura.
- Zgłaszanie incydentów
- Wszystkie powstane incydenty, do ktorých doszlo w zwiazku z uzyciem tego wyrobu, zgłaszac producentowi i/lub wlasciwiej instytucji nadzorujacej.

pt - Instruções de utilização

Finalidade prevista

Extensio para perfusao descartavel esteril para aquecimento de sangue, fluidos intravenosos e fluidos de irrigação em combinação com o ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS e PRISMATHERM II. O grupo de doentes alvo é constituído por doentes com necessidade de perfusões de calor e de transfusão em cuidados intensivos, durante intervenções perioperatórias, ou aplicações de diálise. Os grupos de doentes com um peso corporal inferior a 3,5 kg estão excluídos da aplicação.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii de transfuzii termice în secția de intervenții chirurgicale sau la aplicatorul de dializă. Grupurile de pacienți cu o greutate corporală mai mică de 3,5 kg sunt excluse.

Indurări pentru manipulare

Extensia de perfuzie ASTOTUBE poate fi utilizată numai în combinație cu încălzitoare ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II, seturi de perfuzie/ transfuzie standard și canule venoase interioare standard. ASTOTUBE poate fi utilizat numai în unități medicale profesionale și numai de către personal calificat.

Informații de siguranță e aviso

Risco de leșão!

- Consulte as instruções de utilização dos aquecedores ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS ou PRISMATHERM II.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de infecção!

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar se as tampas de proteção estiverem fora do lugar.
- Alguns medicamentos podem não ser compatíveis com os materiais e componentes dos tubos ou com medicamentos perfundidos em simultâneo. Consulte o RCM dos medicamentos.
- Qualquer reutilização representa um risco potencial para o doente ou perigo de infeção.

Risco de embolia gaseosa!

- Quando os fluidos são aquecidos, é possível que ocorra formação de gás (forma de bolha).
- Certifique-se de que todos os ligamentos do fluxo de fluido completo estão fixos firmemente de modo a evitar fugas de fluido e uma perfusão inadvertida de ar no fluxo de fluido.
- Encha todos os filtros, linhas e conjuntos descartáveis antes de iniciar um tratamento.
- Deve ter-se sempre extrema cuidado para garantir que não é administrado um bolus de ar no doente.

Risco de hemólise!

- Certifique-se de que a linha de perfusão não está dobrada.

Eliminação

Os resíduos biológicos perigosos devem ser eliminados de acordo com o protocolo local.

Comunicação de incidentes

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente.

ro - Instrucțiuni de utilizare

Scop de utilizare prevăzută

Extensie de perfuzie sterilă, de unică folosință, pentru încălzirea fluidelor fluidelor intravenoase și a fluidelor de irigare în combinație cu ASTOTHERM, ASTOTHERM PLUS și PRISMATHERM II. Grupul țintă de pacienți este reprezentat de pacienți care au nevoie de perfuzii